



Actein Effervescent Tab 600mg

(愛克痰 發泡錠)

學名：Acetylcysteine 發泡錠

商品名：Actein Effervescent Tab 600mg (健喬信元)

中文名：愛克痰 發泡錠

藥品外觀：白色圓錠,一面有「SYG」字樣。

用途：減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性，可幫助痰液稀化排出。

使用方法：

1. 本藥供六歲以上兒童或成人使用，飯前飯後皆可，實際用法用量請依照您的醫師處方使用。
2. 不可直接吞服，請將發泡錠置於玻璃杯中加入適量水使其完全溶解，混合均勻後即可直接飲用。
3. 因為本藥容易潮解，請於要使用時再打開包裝取出。

忘了用藥怎麼辦？

1. 當您記起來時，請立刻補服。但若已接近下次用藥時間，則服用一次之劑量即可(省略一次)，切勿一次服用雙倍以上劑量。
2. 不要自行改變劑量或停用；使用上有任何問題應先與醫師商量後，依醫囑使用。

注意事項：

1. 請告知醫師是否有同時服用其他藥品，包括維他命、營養補充、草藥產品；不建議將其他藥物和本藥溶解成的藥液一起使用。
2. 如果有在使用成分含有卡巴氮平類 (Carbamazepine) 癲癇/神經疼痛治療藥或是硝化甘油類(Nitroglycerin)狹心症心絞痛治療藥，請事先告知醫師。
3. 請告知醫生是否懷孕或是準備懷孕、哺乳；本藥懷孕分級為 B，孕婦可使用；目前哺乳婦使用本藥對嬰兒是否有影響尚不明確，所以不建議哺乳婦使用。
4. 如果您有肝、腎方面的疾病、胃部的不適或潰瘍，請先告知您的醫生。
5. 本品含阿斯巴糖，苯酮尿患者請勿使用。
6. 患有支氣管哮喘的病人使用本藥如出現支氣管痙攣請立即停止使用。
7. 本藥可能有硫臭味，此為主成分特有味道，請放心使用。

可能的副作用：

1. 如果發生下列副作用，請停止使用並盡速告知您的醫生：
 - a.過敏反應：臉或手部發癢、起疹子、腫塊；嘴巴或喉嚨刺痛、有腫塊；胸悶。



- b.呼吸困難。
 - c.起疹子並發燒。
 - d.嚴重或不停的嘔吐。
2. 如果發生下列較輕微的副作用，請和您的醫生商量是否繼續使用：
_輕微的噁心感、嘔吐、腸胃不適或起疹子。
3. 若您注意到其他您認為是使用本藥後產生的副作用，請告知您的醫師。

保存方法：

1. 本藥請置於室溫(攝氏 30 度以下)陰涼乾燥處貯存，避免熱源及陽光直射。
2. 藥品須放置於兒童無法觸及處，以免誤服用藥品。
3. 本藥品開封後請盡速使用。