



Amaryl tab 2mg (瑪爾胰錠)

學名：Glimepiride 錠

商品名：Amaryl tab 2mg (賽諾菲安萬特)

中文名：瑪爾胰錠

藥品外觀：綠色 8 字型橢圓錠，兩面皆有剝痕及「NMM」字樣。

用途：

降低非胰島素依賴型(第 2 型)糖尿病患者血糖。

使用方法：

本藥為口服藥，通常一天服用一次，請於每日的早餐中服用，若沒有吃早餐的習慣，請在第一餐正餐中服用，若有特殊使用方法請遵照醫生指示服用。服藥時，請用適量水吞服藥物。

忘了用藥怎麼辦？

記起來時立刻服用，但若已接近下次用藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下次劑量，不可一次使用雙倍劑量。

注意事項：

1. 請在服藥前告知醫師您過去是否曾因為服用藥物而發生過敏反應。
2. 如有懷孕或準備懷孕或是正在授乳中，請在服藥前告知醫生，孕婦通常使用胰島素來控制血糖。
3. 告知醫師您目前正在使用的藥物(包括成藥、營養品)，如要服用其他藥物(包括成藥、營養品)也請先告知醫生。
4. 應告知醫師您是否有腎、肝、心臟、甲狀腺及內分泌等疾病，以及是否曾經有酮酸血症。
5. 請在任何醫療處置前，先告知該醫師您正在服用此類藥品。
6. 飲酒可能影響本藥降低血糖的作用，建議您在服藥期間避免飲酒。
7. 請確實遵醫囑檢驗血糖、尿糖，以便醫師評估療效，調整劑量。
8. 如有高血糖症狀(極度口渴、多尿、皮膚乾燥、複視、噁心、嘔吐等)應告知醫師，以調整劑量或飲食。
9. 有些人在服藥後會發生低血糖症狀，而影響注意力、反應力還有視覺，這些影響可能會導致某些危險情形之發生，請您在開車或操作機器時特別注意身體狀況。
10. 外出時應確認攜帶足夠藥品和糖果在身上，並置於隨身行李，避免因托運行李可能運丟或過熱、過冷而影響藥品安定。若至有時差的地區旅行，請盡量維持原用餐用藥時間。
11. 建議您隨身攜帶藥袋以便突發狀況時(如低血糖發作)能爭取時間解決問



題。

12. 您的飲食及運動應規律且定時，延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
13. 發現有低血糖的不適症狀時 可以立即服用少量葡萄糖，若沒有則用糖果或果汁代替(人工甘味劑如代糖等無效)，10-15 分鐘後如果症狀沒有解除，可以再吃一次，但如果低血糖症狀一直沒有改善，就應該立刻送醫治療。如果症狀改善，但離下一餐還有一小時以上，最好吃些澱粉類食物如土司或餅乾。(低血糖可能的症狀包括：頭痛、虛弱、噁心、嗜睡、心跳加快、冒冷汗、膚色灰白、精神混亂、無法思考、視力模糊、語言障礙、顫抖、抽搐、喪失意識、昏迷)。

可能的副作用：

1. 副作用並不常見。
2. 假如有下列低血糖症狀，請立即吃點含糖食物或飲料如方糖/糖果/果汁等，並與您的醫師連絡。
低血糖症狀：發抖、暈眩、心跳加速、冒汗、混亂、視力模糊、頭痛、嘴唇刺痛/發麻、虛弱、臉色蒼白、飢餓感等。
3. 假如你曾發生癲癇、意識失去等症狀，請立即與您的醫師連絡。
4. 假如有下列高血糖症狀，請立即與您的醫師連絡。
高血糖症狀：口渴、嘴乾、疲勞、臉色發紅、皮膚乾燥、頻尿、食慾不佳、呼吸困難等。

保存方法：

1. 請置於緊密容器貯存於室溫、乾燥、避光處(避免陽光直射，不要放在曝曬的汽車內)，使用前再將錠劑由鋁箔包裝中剝出使用。
2. 藥品置於原來藥袋內。並放在小孩無法取得之處。若過期請立即丟棄。