



Augmentin FC tab 875mg/125mg

(安滅菌膜衣錠)

學名：Amoxicillin 875 mg + Clavulanate potassium 125 mg 膜衣錠

商品名：Augmentin FC tab 875mg/125mg (荷商葛蘭素史克)

中文名：安滅菌 膜衣錠

藥品外觀：白色橢圓膜衣錠，一面有一字刻痕，兩面皆有「A C」字樣。

用途：

本藥為抗生素，可治療上下呼吸道、生殖泌尿道、骨骼與關節、皮膚及牙科等對本藥具感受性的細菌感染。

使用方法：

- 1.請遵照醫師指示服用，通常一天服用二次，於早、晚固定時間或每 12 小時服藥。
- 2.錠劑需整粒吞服，不可咀嚼。如有需要可將錠劑分成兩半以利吞服。
- 3.本藥可於進食時服用，減低對腸胃道影響。

忘了用藥怎麼辦？

記起來時立刻服用，但若已接近下次用藥時間，則跳過一次，照原來預定時間服用下次劑量，不可一次使用雙倍劑量。

注意事項：

- 1.懷孕，預計懷孕，授乳，患有肝、腎疾病或黃疸，對 penicillin 類、頭孢子菌素(cephalosporins)類抗生素過敏或對其他藥物過敏者，請先告訴醫師。
- 2.治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程，以免中斷抗生素治療導致抗藥性菌種產生。
- 3.本藥可能會影響某些藥的療效，請告訴醫師您目前服用的所有藥物，特別是其他抗生素、口服避孕藥、抗痛風藥物(如 probenecid、allopurinol)、抗凝血藥等。使用口服避孕藥避孕者服用本藥期間請使用第二種避孕方式。

可能的副作用：

- 1.可能有噁心、腹瀉等症狀，假如症狀持續或惡化時，請盡快回診告知醫師。
- 2.極少部份病人可能會對本藥過敏，服藥後若出現呼吸困難、氣喘、蕁麻疹、皮膚發紅發癢等症狀，請停藥並盡快就醫。



三軍總醫院 Tri-Service General Hospital
宗旨：發揚優良傳統，提供軍民最優質的醫療服務。
願景：軍民之首選醫院、社區健康守護者、國際級醫學中心。

保存方法：

1. 藥品請置於原來藥袋內，放在緊密容器貯存於室溫、乾燥、避光處，使用前再將錠劑由鋁箔包裝中剝出使用。
2. 藥品請放在小孩無法取得處。