



Baraclude Tab 1 mg

(貝樂克 膜衣錠)

學名：Entecavir 膜衣錠

商品名：Baraclude Tab 1 mg (臺灣必治妥施貴寶)

中文名：貝樂克 膜衣錠

用途：治療有 B 型肝炎病毒複製跡象的成人慢性 B 型肝炎患者。

使用方法：

- 1) 本藥應空腹服用，服藥至少 2 小時後才可吃飯，或飯後至少 2 小時才能服用。
- 2) 實際用法用量請遵醫囑使用，切勿自行停藥或未經醫囑調整用藥劑量。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，到下次原本預定服藥的時間再服藥，不可一次服用雙倍以上劑量。

注意事項：

- 1) 若您有下列狀況，不可使用本藥：曾對本藥主成分 entecavir 或其他成分過敏。
- 2) 若有下列情況，請確認已先告知您的醫師：有腎臟疾病、肝臟疾病、做過肝臟移植、合併感染人類免疫不全病毒、懷孕、預備懷孕與授乳。
- 3) 本藥無法治癒肝炎也無法防止肝炎病毒經由性行為或血液的傳播，進行性行為時務必妥善的預防措施，例如戴保險套。
- 4) 使用本藥治療期間及停止治療後一段時間，醫師會幫您安排檢查，如：B 型肝炎抗體抗原測驗、肝功能、腎功能或血液學檢查等，請務必在醫師為您安排的時間接受檢查。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用，若發生，請於回診時告知醫師；但若症狀持續、加重，或已造成您的困擾，請提前回診告知醫師：
 - 噁心、頭暈、頭痛、疲倦等現象。
- 2) 若您於服藥期間，發生下列罕見但較嚴重的副作用，請盡快就醫：
 - 過敏反應：手、腳或腳踝、臉、嘴唇、舌頭及喉嚨發生腫脹，甚至造成胸悶、呼吸困難、刺痛。
 - 肝功能異常：深色尿、淺色糞便、胃痛、無食慾、皮膚或眼白部分泛黃。
 - 乳酸性酸中毒：嚴重虛弱感、意識模糊、頭暈眼花、腹痛。
- 3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。

三軍總醫院 祝您健康快樂



三軍總醫院 Tri-Service General Hospital
宗旨：提供軍人、軍眷及民眾最優質的醫療服務。
願景：軍民之首選醫院、社區健康守護者、國際級醫學中心。

保存方法：

- 1) 請您將本藥連同藥袋儲存於攝氏 30 度以下陰涼乾燥環境，避免潮濕及陽光直射，不需冷藏或冷凍。
- 2) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 3) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 4) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。
- 5) 過期或不需使用的藥品請依當地衛生主管機關規定處理或詢問藥師如何處理。