



# Betaloc ZOK tab 100mg

## (舒壓寧 控釋錠)

學名：Metoprolol succinate 控釋錠

商品名：Betaloc ZOK tab 100mg (臺灣阿斯特捷利康)

中文名：舒壓寧 控釋錠

藥品外觀：白色圓形錠，一面有一刻痕，另一面有 AMS 字樣。

用途：選擇性  $\beta_1$  接受體阻斷劑。治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞之急性期後預防心肌之死亡及再梗塞、心律不整。

### 使用方法：

1. 實際用量請依照醫師之處方量使用，切勿自行增減藥量。本藥為長效劑型，通常每日服用一次即可。
2. 建議於用早餐時，以足量之飲用水吞服。
3. 請按照醫師處方之劑量使用。若只需服用半粒，可切半(不可咀嚼或壓碎)後，以足量之飲用水吞服。

### 忘了用藥怎麼辦？

當您記起時，請馬上補服。但如果想到時已差不多為下次服藥時間，請服用一次之劑量即可(省略一次)，切不可服用雙倍劑量。

### 注意事項：

1. 若無醫師指示，切勿突然自行停藥。身上請攜帶紙條，告知別人您服用本藥。
2. 懷孕或預備懷孕之婦女，服用本藥前請先告知醫師。
3. 授乳婦不宜服用本藥。
4. 避免攝取過多鹽份，醫師可能會告訴您應採低鈉低鹽飲食，請遵照醫師的指示。
5. 曾有下列病史或狀況者，服藥前請先告知醫師：
  - 曾對任何  $\beta_1$  接受體阻斷劑過敏
  - 嚴重心臟疾患
  - 過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫
  - 甲狀腺功能亢進
  - 低血糖症
  - 肝或腎功能不全



- 糖尿病或重症肌無力
  - 正服用毛地黃類強心劑(digitalis)，quinidine 或 reserpine，或任何鈣離子阻斷劑
  - 末梢循環不良(周邊血管疾患)
  - 間歇性跛行
  - 最近準備進行需全身麻醉之手術
6. 有下列狀況者，請勿服用此藥：
- 曾對本藥過敏
  - 患有鬱血性心衰竭
  - 曾心臟病發作過且心跳速率每分鐘小於 45 下
  - 不正常之心搏過慢或嚴重之心傳導障礙
  - 正服用或過去 14 天內曾服用 A 型單胺酶(monoamine-oxidase)抑制劑

#### 可能的副作用：

1. 下列副作用雖不常見，但仍可能發生，若症狀嚴重或不會自行消失，請告知您的醫師：頭昏眼花、極度倦怠感、胃部不適、嘔吐、下痢、便秘、潮紅、手腳冰冷。
2. 若出現下列任何罕見症狀，請馬上與醫師連絡或就醫：呼吸困難、喉痛發燒、不尋常出血、手或腳水腫、不尋常之體重增加、胸痛、心跳變慢且不規則。

#### 保存方法：

請將藥品置於兒童拿不到的地方。本藥請置室溫下(30°C 以下)陰涼處貯存。