



Cafergot tab 1mg/100mg (加非葛錠)

學名：Ergotamine tartrate 1mg + Caffeine anhydrous 100 mg 錠

商品名：Cafergot tab 1mg/100mg (台灣諾華)

中文名：加非葛錠

藥品外觀：淺黃色扁圓錠，一面有刻痕及 X、L 字樣。

用途：

緩解血管性頭痛，如偏頭痛、組織胺性頭痛。

使用方法：

1. 本藥需由醫師處方使用。
2. 可於頭痛症狀初出現時，盡快服用本藥。成人首次服用本藥，建議起始劑量為 2 錠。假如此劑量在半小時內無法紓解症狀，可再服 1 錠；依此以最快半小時間隔重複用藥至症狀緩解，但不可超過每日最大劑量。
3. 對後續的發作，起始劑量可增加至最高量為 3 錠，依據前一次發作所需總藥量而定。假如疼痛仍持續，可以增加劑量，每半小時間隔 1 錠直到最高劑量為止。
4. 每次發作或每日最高劑量，成人：6 mg ergotamine tartrate 相當於本藥 6 錠。
5. 每週最高劑量，成人：10 mg ergotamine tartrate 相當於本藥 10 錠。

忘記用藥怎麼辦：

本藥為症狀解除用藥，需要時才使用。

注意事項：

1. 請告知醫師或藥師您是否曾對本藥或其他藥物過敏。
2. 本藥只用於治療急性偏頭痛的發作，不可作為預防性治療之用。
3. 服用本藥後可能對冷的溫度較敏感，請做適當保暖並避免長時間曝露於冷空氣中
4. 服用本藥期間請勿飲酒。
5. 避免每天持續使用本藥，以免引起血管痙攣；避免長期使用本藥，因為可能產生纖維化病變。
6. 懷孕期間禁用本藥，因 ergotamine 對胎盤及臍帶具催生與血管收縮的作用。
7. 哺乳婦女禁用本藥，因為 ergotamine 會分泌於母乳中因此會引起嬰兒嘔



吐、腹瀉，脈搏微弱及血壓不穩定的症狀。

8. 病患偶有暈眩現象或反應能力受到影響，應避免開車或操作危險的機器。

可能的副作用：

1. 若出現下列較不嚴重的症狀，請於回診時告訴醫師，若症狀持續或變嚴重，請提前回診：
輕微的噁心或嘔吐、輕微的搔癢、手或腳出現紅色或紫色小水泡。
2. 下列副作用較罕見但較嚴重，若出現請停藥盡快就醫：
胸痛；心跳不規律；手臂或腿部肌肉疼痛；手指或腳趾麻木或刺痛；嚴重搔癢或起疹子。

保存方法：

於陰涼乾燥處避光貯存。藥品應置於兒童無法取得處。