



三軍總醫院 Tri-Service General Hospital

宗旨：提供軍人、軍眷及民眾最優質的醫療服務。

願景：軍民之首選醫院、社區健康守護者、國際級醫學中心。

Depakine Soln 200 mg/mL 40 mL (帝拔癲 口服液)

學名：Sodium valproic acid 口服液

商品名：Depakine Soln 200 mg/mL 40 mL (賽諾菲安萬特)

中文名：帝拔癲 口服液

用途：本藥為口服液劑，主用於控制癲癇發作，臨床上也可治療情緒問題或預防偏頭痛，確實用途請詢問您的醫師。

使用方法：

- 1) 開瓶時，請將瓶蓋向下壓同時逆時針旋轉即可打開。
- 2) 請以隨瓶所附之針筒狀量管量取醫囑劑量，並以少量水或飲料(但不可使用碳酸飲料如汽水或可樂等)稀釋後服用。
- 3) 本品每西西(mL)含量為 200 毫克(mg)，隨包裝所附的針筒狀量管，請依左側 mL 之刻度量取醫囑劑量。
- 4) 建議隨餐服用(與食物併服)可減少腸胃不適。
- 5) 用法用量請依照醫師處方或實際醫囑使用，不可自行增減藥量或頻次。

忘了用藥怎麼辦？

想起時盡快補服，若想起時已接近下一次服藥時間，則於下次服藥時間服用一次劑量即可，千萬不可一次服用兩倍劑量。

注意事項：

- 1) 有下列狀況者，不可使用本藥：曾對本藥任何成分過敏、嚴重肝臟疾病、懷孕或計畫懷孕者。
- 2) 懷孕或準備懷孕的婦女請先告知您的醫師，由醫師評估您用藥的利益和風險。育齡婦女服用本藥期間請有效避孕。
- 3) 有下列狀況或疾病者，請確認已先告知您的醫師：授乳、腎臟或肝臟疾病、血液方面疾病。
- 4) 本藥可能引起頭暈或想睡，在不清楚藥品對您產生的影響前，請避免從事需保持高度警覺性或專注力的活動如駕駛、操作危險器械等。
- 5) 長期使用本藥，建議例行進行肝功能檢查，若您有不舒服、無力、嗜睡、面部浮腫、厭食、嘔吐等現象，請儘快就醫。
- 6) 不可自行突然停藥以免加重癲癇發作，若需停藥必須由醫師指示以劑量漸減方式停藥。
- 7) 服用本藥期間避免飲用含有酒精之飲品。
- 8) 本藥與其他某些藥品併用可能會產生相互影響，請先告知醫師您在使用的所有藥品，尤其是會影響血液凝固的藥品例如 warfarin、阿斯匹靈等，會導致睡意或鎮定類藥品如鎮定安眠藥、感冒藥等。也請告知其他醫師您正在服用本藥。

三軍總醫院 祝您健康快樂



9. 服藥期間，若發生情緒低落或有自戕意圖時，應告知醫師，並建議儘快回診。
10. 服藥後若發生疑似服藥後皮膚等過敏反應，請立即就醫。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列為可能發生但較不嚴重的副作用，若發生請於回診時告知醫師，但若症狀持續或變嚴重，或是已造成您的困擾時，請提前回診告知醫師：
 - 腹瀉或便秘，嗜睡或頭暈，脫髮，噁心，嘔吐，胃痙攣，煩躁不安或易怒。
- 2) 下列為罕見但較嚴重的副作用，若出現請儘快就醫：
 - 搔癢、皮疹或蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴或咽喉腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難等過敏現象，癲癇發作，嚴重持續性嘔吐，虛弱或頭暈，不尋常出血或瘀傷以及皮膚或眼白處變黃。
- 3) 如果您發現其他上述未提及之副作用，且認為可能是此藥所造成，請於回診時告知你的醫生。

保存方法：

- 1) 本藥未開封前請放置於 25°C 以下陰涼乾燥處保存。
- 2) 開封後每次用畢應將蓋子旋緊保存，若室溫過高，建議可置於冰箱內冷藏保存。請於醫囑療程內使用完畢。
- 3) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 4) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 5) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。
- 6) 過期或不需使用的藥品請依當地衛生主管機關規定處理或詢問藥師如何處理。