



Eloxatin Inj 5 mg/mL 10 mL

(益樂鉑定 注射液)

學 名：Oxaliplatin 注射液

商品名：Eloxatin Inj 5 mg/mL 10 mL (賽諾菲安萬特)

中文名：益樂鉑定 注射液

用 途：本藥藉由殺死癌細胞來治療結腸癌、轉移性結腸直腸癌、轉移性胃癌等。本類藥品作用強烈且免不了會有某些副作用，您的醫師會告訴您本藥的治療計畫，也會監控您的身體狀況，以減少副作用的發生或其嚴重程度，請配合計畫按時回院完成療程，並密切配合完成醫師為您安排的檢查。

使用方法：

- 1) 本藥調配後外觀為澄清無色溶液，治療時由靜脈輸注給藥，輸注時間約 2 至 6 小時。
- 2) 您的醫師可能會同時開立止吐藥品、抗過敏藥品或是其他癌症治療藥品一起使用。
- 3) 開始輸注本藥品之前，建議您先如廁後再進行治療，盡量避免活動頻繁，導致輸注管路拉扯鬆脫，造成化療藥品外滲而發生危險。
- 4) 輸注期間，請隨時留意點滴輸注部位是否有滲濕或刺痛之異常狀況，若發生請務必立即通知護理人員處理，並避免您的皮膚、眼睛、鼻子或嘴巴不慎接觸到此藥品。

忘了用藥怎麼辦？

本藥需要按照既定療程時間給藥，若是您錯過一次治療，請馬上與您的醫師或醫療院所聯絡，以便盡快另外安排治療時間。

注意事項：

- 1) 若您有下列狀況，不可使用本藥：
 - 曾經對本藥主成分、其他成分嚴重過敏或對其他鉑製劑嚴重過敏。
 - 目前正懷孕或哺乳。
 - 治療前有嚴重的骨髓抑制問題（白血球、嗜中性白血球、血小板的數量嚴重過低）。
- 2) 請將您的完整藥物過敏史告訴醫師，包括何種藥品導致過敏，過敏的症狀（例如疹子，蕁麻疹，搔癢，呼吸困難，呼吸喘，咳嗽，臉、嘴唇、舌頭或喉嚨腫起等）及嚴重程度。
- 3) 若您目前或曾經有腎臟疾病，請先告知醫師。
- 4) 注意保暖（感覺冷時，可穿戴毛衣、圍巾、手套、帽子），避免進食冰的食物及冷飲，也避免用冷水洗手。避免碰觸冷的東西或物體。從冰箱中，尤其



是冷凍庫，拿取食物時，最好穿戴手套。

- 5) 使用本藥治療期間若要注射流感疫苗或是其他疫苗，請務必先與醫師討論，因為這段期間疫苗可能無法產生效果或是增加您受到感染的機會。
- 6) 治療期間，本藥會讓您體內某些血球數量減少，造成你比一般人容易出血或不容易止血，可使用軟質刷毛牙刷刷牙及小心使用尖銳性器具，例如指甲剪、刮鬍刀來避免受傷流血。因與免疫相關的血球減少，受到感染的機會可能會提高，治療期間，容易被感染，請盡量避免出入公共場所及預防感冒，並勤洗手、戴口罩來預防感染。
- 7) 服用任何其他藥品（包括成藥、維他命、健康食品或中草藥）前，請先諮詢您的醫師或藥師，特別是口服抗凝血劑，如：warfarin。
- 8) 使用本藥治療期間，您的醫師會幫您安排定期回診檢查血球數目或是尿液、聽力及肝腎功能檢查等，請務必在醫師為您安排的時間回醫院接受檢查。
- 9) 治療期間若產生腹瀉時，應避免服用牛奶製品、油膩、高纖維的食物，如花生、麥麩、水果、蔬菜。請多補充水份、電解質，嚴重時可以依醫囑使用止瀉劑。
- 10) 如果您將要進行手術（包含牙科手術），要記得告訴醫師或牙醫師，您正在使用本藥。
- 11) 治療期間應了解藥品引起神經毒性、噁心嘔吐及骨髓抑制等症狀（參考“可能的副作用”），於症狀發生時立即與您的醫師聯絡。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列症狀為較嚴重但不一定會發生的副作用，若在輸注時發生，請馬上告訴醫療人員，若在醫療院所外發生，請立即就醫：
 - 過敏反應：心跳異常加快、搔癢或出疹子、臉或手腫脹、舌頭感覺異常、口或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
 - 視覺或聽覺模糊
 - 意識不清、虛弱、肌肉抽搐或抽筋。
 - 口乾、舌躁、噁心、嘔吐。
 - 發燒、發冷、咳嗽、喉嚨發炎疼痛。
 - 手、手臂、腿或足發麻、刺痛或有灼熱痛感。
 - 排尿疼痛、血尿、解黑便
 - 無法控制的噁心及嘔吐。
 - 不尋常的出血(如流鼻血)、瘀傷或是虛弱。
- 2) 若出現下列較不嚴重的副作用，請於回診時告訴醫師，若症狀持續未自行緩解或是變嚴重，請提前回診：



三軍總醫院 Tri-Service General Hospital
宗旨：發揚優良傳統，提供軍民最優質的醫療服務。
願景：軍民之首選醫院、社區健康守護者、國際級醫學中心。

- 便秘或腹瀉。
 - 背痛
 - 食慾不振。
 - 注射部位紅腫。
- 3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。