



# Exelon Patch 5

## (憶思能 穿皮貼片 5)

學名：Rivastigmine 穿皮貼片

商品名：Exelon Patch 5 (台灣諾華)

中文名：憶思能 穿皮貼片 5

藥品外觀：圓形貼片，背面印有「AMCX」字樣。

用途：用於治療輕度至中度阿茲海默氏病之癡呆(失智)症。

### 使用方法：

- 1) 請依照醫師處方劑量使用，原則上每日使用一片，每次只能貼一片，每天於固定時間更換新的貼片。
- 2) 建議可於每日洗完澡後更換貼片，貼片應黏貼於清潔、乾燥且無毛髮的完整健康的皮膚上，黏貼部位不可塗敷乳液、油、粉或潤滑液，也不可貼在受傷破皮或有疹子處。貼片黏貼的地方應選擇不會因衣物磨擦而使貼片掉落的部位。
- 3) 若病人可能會自己撕掉貼片不貼，可將貼片黏貼於病人的上背或下背無法自行撕去的部位，否則也可貼於病人的上臂外側或胸部。
- 4) 貼片採單片包裝，請於要黏貼時再沿包裝虛線剪開，將貼片取出，貼片本身不可切割，需確定完好才可使用。
- 5) 把手洗淨擦乾後，將貼片上半部保護膜掀開撕去，注意手不要接觸到貼片有黏性的那面。
- 6) 將露出來有黏性的那半面貼在病人預定要貼的適當部位，以手指按住已貼上的貼片部份，再用另一手小心將另一半保護膜撕下後，將整片貼片平整的貼在皮膚上，以手掌按壓在貼片上確定貼片邊緣皆已緊貼在皮膚上再放開手掌。
- 7) 貼片應每24小時更換一片，一次只能貼一片，先將舊的一片撕下，再貼上新的。且每日更換貼片的時間最好固定，可用原子筆輕輕在Exelon Patch背面上註明黏貼的日期時間，並將更換貼片排入每日固定的作息時間表，以適當的方式提醒。
- 8) 更換貼片時，小心掀起舊貼片的一邊，拉住邊緣將貼片整片完整撕下。貼片

三軍總醫院 祝您健康快樂



撕下後，請將有黏性的一面向內對摺壓緊後，放進原來的保護袋中。小心丟棄在兒童及寵物看不到及無法取得的地方。

- 9) 即使在使用24小時後，貼片上仍有藥量殘留，要避免接觸到眼睛，處理完貼片後要以肥皂和水洗手。
- 10) 黏貼的部位應每天變換（例如第一天貼在身體右側，然後第二天貼在身體的左側），以避免對皮膚產生刺激性。相同的黏貼點於14天內不宜重複黏貼，可事先規劃黏貼部位的順序。

### 忘了用藥怎麼辦？

- 1) 想起來時馬上換貼新的一片，到了隔天的給藥時間，再換貼另一片貼片，絕對不可同時貼二片。
- 2) 三天或三天以上未使用本品，劑量必須重新調整，請先回診告訴醫師。

### 注意事項：

- 1) 曾對本藥任何成分過敏者不可使用本藥，請將病人的完整過敏史先告知醫師。
- 2) 如果病人有下列狀況或病史，在使用本藥前請確認先讓您的醫生知道：心律不整、癲癇、排尿困難、胃或腸道潰瘍、氣喘或其他嚴重的呼吸疾病、有震顫的問題、體重過輕（低於 50公斤）、肝功能不好或吸煙。
- 3) 一次只能使用一片，藥物過量可能會產生更嚴重的副作用，例如噁心，嚴重嘔吐，食慾不振，腹瀉等。
- 4) 除非經醫師指示，否則不可自行停止使用此藥。
- 5) 使用本藥可能會讓使用者頭暈或昏昏欲睡，在未了解藥品對病人產生的影響前，請避免讓病人從事需要警覺及協調性的工作或活動，例如駕駛、操作危險器械。
- 6) 請告知病人的其他醫師或牙醫病人正在使用本藥，因為在做某些手術或檢查前可能須停止使用本藥數天。
- 7) 用藥期間若出現下列任何症狀，請立即停藥就醫：過敏反應：搔癢或蕁麻疹，臉或手腫脹，嘴或咽喉刺痛，胸悶或呼吸困難。
- 8) 洗澡、游泳或淋浴時應該都不會影響貼片。但需注意，游泳前需將貼片貼於泳衣可以覆蓋的地方，確認貼片不會因活動進行而脫落。貼片使用中應避免長時間曝露在外部的熱源中（過度日曬、三溫暖、日光浴、電熱毯等）。
- 9) 若貼片脫落無法再貼回，請將脫落的貼片對摺黏好妥善丟棄，並立即貼上新的貼片，隔天再於原本預定換藥的時間換新的貼片。
- 10) 若貼片只是稍微鬆脫，可在外層黏貼紙膠固定。

### 可能的副作用：

三軍總醫院 祝您健康快樂



- 1) 下列為少見但較嚴重的副作用症狀，若病人用藥後出現下列症狀，請立即停藥並儘速就醫：
  - 過敏反應：搔癢或蕁麻疹，臉或手腫脹，嘴或咽喉刺痛，胸悶或呼吸困難。
  - 排尿量或次數改變，排尿疼痛。
  - 胸痛。
  - 口乾，口渴加劇，或肌肉痙攣。
  - 眼睛痛，視力發生變化。
  - 心跳變快或慢，或不規則。
  - 頭昏眼花或快昏厥感。
  - 糞便呈紅色或黑色。
  - 癲癇發作或震顫。
  - 突然且嚴重的胃痛、噁心、嘔吐，或發燒。
  - 雙手，腳踝，或足部腫脹。
  - 異常的出血，瘀血，或虛弱。
- 2) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用症狀，若出現，可於回診時告訴醫師，如果症狀變嚴重或未緩解造成困擾，請提前回診：
  - 焦慮或憂鬱。
  - 頭暈或頭痛。
  - 食慾不振或體重減輕。
  - 輕微的噁心、嘔吐、腹瀉或胃痛。
  - 疲倦。
  - 睡眠問題。
- 3) 若發現其他可能是因為使用本藥造成的副作用，請於回診時告知醫師。

#### 保存方法：

- 1) 於陰涼乾燥避光的環境（攝氏30°C以下）保存。
- 2) 每個保護袋中放有一片貼片。憶思能穿皮貼片在使用前應密封保存在個別的保護袋中。
- 3) 超過憶思能穿皮貼片外盒及保護袋上標示的有效期限，請勿使用。
- 4) 憶思能穿皮貼片保護袋如有破損或已拆封的痕跡，請勿使用。
- 5) 憶思能穿皮貼片應放在兒童及寵物拿不到和看不到的地方。