



Galvus Tab 50 mg (高糖優適 錠)

學名：Vildagliptin 錠

商品名：Galvus Tab 50 mg (臺灣諾華)

中文名：高糖優適 錠

用途：本藥為 DPP4-抑制劑 (二肽基肽酶-4 酵素抑制劑)，用來治療第二型糖尿病。

使用方法：

- 1) 可隨餐或空腹服用，建議每日固定時間服用。
- 2) 實際用法用量請遵醫囑使用。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，不可一次服用雙倍以上劑量。

注意事項：

- 1) 若您有下列狀況，不可使用本藥：曾經對本藥主成份 vildagliptin 或其他成分過敏者、第一型糖尿病人、或正發生糖尿病酮酸血症者。本藥含有乳糖，患有罕見遺傳性乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症、或葡萄糖半乳糖吸收不良者也不建議服用本藥。
- 2) 若有下列情況，請確認已先告知您的醫師：有肝臟疾病、腎臟疾病、鬱血性心衰竭等病史、曾有嚴重過敏反應、準備接受麻醉或手術、授乳、懷孕或是預備懷孕者。
- 3) 請您將目前使用的藥品 (包括市售成藥、各類營養食品以及中草藥等) 告知醫師。尤其是服用其他降血糖藥品、thiazides 類或其他種類的利尿劑、類固醇、甲狀腺製劑等。這些藥物與本藥併用會互相影響療效或增加副作用的嚴重度，請務必先告知醫師，讓醫師確認藥品如何開立。
- 4) 本藥服用後可能會感到暈眩，在不確定本藥對您造成的影響前，請避免從事需專注力及協調力的活動，例如開車或操作危險器械。
- 5) 突然停用本藥可能會造成血糖不穩，請按時服用本藥，勿自行停用。
- 6) 治療期間，醫師會幫您安排定期檢查，如：血糖及糖化血色素檢查、眼科檢查、足部檢查或血液學檢查等，請務必在醫師為您安排的時間接受檢查。
- 7) 本藥可能會造成極少見但嚴重的副作用，如胰臟炎或是肝臟發炎；若您有出現嚴重的不適症狀時 (請參閱：可能的副作用 2))，請立即就醫。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

三軍總醫院 祝您健康快樂



- 1) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用，若發生，請於回診時告知醫師；但若症狀持續、加重，或已造成您的困擾，請提前回診告知醫師：
 - 暈眩、顫抖、頭痛、噁心、嘔吐、低血糖、週邊水腫。
- 2) 若您於服藥期間，發生下列罕見但較嚴重的副作用，請盡快就醫：
 - 過敏反應：皮膚癢或起蕁麻疹；手、腳或腳踝水腫，甚至臉、嘴唇、舌頭、喉嚨發生腫脹，或是胸悶、呼吸困難、刺痛等情況。
 - 持續、劇烈的腹痛或嘔吐。
 - 皮膚或眼白泛黃。
 - 食慾不振，食量變少。
 - 異常疲倦或虛弱。
 - 深色尿或大便呈灰白色。
- 3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。

保存方法：

- 1) 請您將本藥連同藥袋儲存於室溫陰涼乾燥環境，避免潮濕及陽光直射，不需冷藏或冷凍。
- 2) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 3) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 4) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。
- 5) 過期或不需使用的藥品請依當地衛生主管機關規定處理或詢問藥師如何處理。