



Januvia FC Tab 100mg

(佳糖維 膜衣錠)

學名：Sitagliptin 膜衣錠

商品名：Januvia FC Tab 100mg (美商默沙東)

中文名：佳糖維 膜衣錠

藥品外觀：黃褐色圓錠，一面有「277」字樣。

用途：第二型糖尿病治療用藥

使用方法：

1. 請依照醫囑使用，切勿自行增減藥量。
2. 本藥通常每日定時服用一次即可，空腹服用或與食物併服均可。

忘了用藥怎麼辦？

1. 當您記起來時，請立刻補服。但若已接近下次用藥時間，則服用一次之劑量即可(省略一次)，切勿一次服用雙倍以上劑量。
2. 不要自行改變劑量或停用；使用上有任何問題應先與醫師商量後，依醫囑使用。

注意事項：

1. 禁用於對本藥任何成份過敏的人；使用時有發生疑似過敏的症狀時，請立即就醫，並告知醫師您所服用藥物。
2. 有酮酸中毒現象的人或第一型糖尿病者，不適用本藥來控制血糖。
3. 請您告知醫師您目前使用的藥物，特別是其他降血糖藥物和毛地黃強心劑(Digoxin)。
4. 懷孕及授乳者不建議使用本藥。若您已經孕、授乳中，或計劃懷孕、授乳請務必先告知醫師。
5. 避免飲酒。
6. 定期檢查。(血糖值、糖化血色素、腎功能、眼睛及足部變化等)
7. 有發燒、疑似感染的情況、剛做完手術或準備要做手術請告知醫師。
8. 請隨身攜帶糖果(含糖分高的食物飲料皆可)，以因應低血糖發生。
9. 確認您已知道發生高血糖或低血糖的症狀及處理方法：
 - a. 低血糖：
 - _症狀：頭暈目眩、心跳加快、饑餓感、焦慮、頭痛等。
 - _處理方法：若血糖低於 70mg/dl 時，服用隨身攜帶的糖果 5~6 顆，並在 15



分鐘後再測一次，如血糖仍低於 70mg/dl 則重覆上述步驟；若血糖高於 70mg/dl，吃些小點心或者用餐。

b.高血糖：

_症狀：若有口渴、嘴乾、疲勞、臉色發紅、皮膚乾燥、頻尿、食慾不佳、呼吸困難

_處理方法：請立即就醫。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

1. 常見副作用：頭痛、咽喉炎及上呼吸道感染。
2. 若有下列副作用發生，請立即就醫：
 - a. 過敏反應（呼吸困難，皮膚腫脹，蕁麻疹，胸悶）。
 - b. 尿量與排尿頻率改變。
 - c. 心跳加快、冒冷汗、冷顫、頭痛、視力模糊、嚴重睡意、意識混亂、倦怠。
 - d. 發燒、發抖、咳嗽、全身疼痛等感冒症狀。
 - e. 突發的嚴重胃痛、噁心、嘔吐或食慾不振。
3. 若有腹痛、噁心、拉肚子等副作用，請回診告知醫師。
4. 若有其他您認為是藥物引起的副作用，請在下次回診時告知您的醫師。

保存方法：

1. 請置於原包裝內，使用前再將錠劑由鋁箔包裝中剝出使用。
2. 請置於室溫(攝氏 25±5 度)陰涼乾燥處貯存，避免熱源及陽光直射。
3. 對於過期或不需使用的藥品可詢問藥師或醫師如何處理。