



Mopride FCTab 5mg

(摩舒胃清 膜衣錠)

學名：Mosapride 膜衣錠

商品名：Mopride FC Tab 5 mg (東生華製藥)

中文名：摩舒胃清 膜衣錠

用途：消化器官蠕動機能異常引起之不適症狀，包括心窩灼熱、噁心、嘔吐。

使用方法：

- 1) 飯前或飯後服用皆可。
- 2) 實際用法用量請遵醫囑使用。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，到下次原本預定服藥的時間再服藥，不可一次服用雙倍以上劑量。

注意事項：

- 1) 曾經對本藥主成份 mosapride 或其他成分過敏者，請勿服用本藥。
- 2) 若有下列情況，請確認已先告知您的醫師：有心臟疾病（例如心律不整）、肝臟疾病；曾經有嚴重過敏反應。
- 3) 有心臟傳導障礙或心室性心律不整病史者，若仍需服用本藥，宜注意若有心律不整情形發生，建議就醫檢查。
- 4) 孕婦或授乳者請避免服用本藥，孕婦、授乳婦或預備懷孕或授乳者請確認已先告知醫師。
- 5) 若服藥二星期症狀仍不見改善時，請重新就醫，勿再繼續長期服用。
- 6) 請您將目前使用的藥品（包括市售成藥、各類營養食品以及中草藥等）告知醫師。尤其是服用具有抗膽鹼作用的藥品或其他會影響肝臟代謝酵素 CYP3A4 活性的藥物，如：硫酸阿托平（atropine）、溴化丁基東莨菪鹼（butylscopolamine）、azole 類抗黴菌藥物、巨環丙酯類抗生素或 HIV 蛋白酶抑制劑等。這些藥物與本藥併用會互相影響療效或增加副作用的嚴重度，請務必先告知醫師，讓醫師確認藥品如何開立。
- 7) 服用本藥時請先從鋁箔包裝中將藥品取出。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用，若發生，請於回診時告知醫師；但若症狀持續、加重，或已造成您的困擾，請提前回診告知醫師：
— 噁心、腹瀉、腹痛、腹脹、頭痛等。
- 2) 若您於服藥期間，發生下列罕見但較嚴重的副作用，請盡快就醫：

三軍總醫院 祝您健康快樂



三軍總醫院 Tri-Service General Hospital

宗旨：提供軍人、軍眷及民眾最優質的醫療服務。

願景：軍民之首選醫院、社區健康守護者、國際級醫學中心。

- 過敏反應：發疹、蕁麻疹、水腫。
 - 腹脹、口腔失去知覺（包括舌頭與嘴唇等）。
 - 心跳太慢或是不規則。
 - 眼白、皮膚變黃、深色尿或灰白色糞便、無食慾、全身倦怠。
- 3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。

保存方法：

- 1) 請您將本藥連同藥袋儲存於室溫陰涼乾燥環境，避免潮濕及陽光直射，不需冷藏或冷凍。
- 2) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 3) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 4) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。
- 5) 過期或不需使用的藥品請依當地衛生主管機關規定處理或詢問藥師如何處理。

三軍總醫院 祝您健康快樂