



Pantoloc EFC Tab 40mg

(保衛康治潰樂 腸溶膜衣錠)

學名：Pantoprazole 腸溶膜衣錠

商品名：Pantoloc EFC tab 40mg (和聯)

中文名：保衛康治潰樂 腸溶膜衣錠 40 毫克

藥品外觀：黃色橢圓錠，一面印有「P40」字樣。

用途：一種氫離子幫浦抑制劑，可抑制胃酸分泌。用於治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍及逆行性食道炎。

使用方法：

- 1) 應整粒以足量飲水（約 240 西西）吞服，不可嚼破或壓破本錠劑；空腹或隨餐服用皆可。
- 2) 實際用法用量請遵醫囑使用。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，到下次原本預定服藥的時間再服藥，不可一次服用雙倍以上劑量。

注意事項：

- 1) 若您有下列狀況，不可使用本藥：曾經對本藥主成份 pantoprazole 或其他成分，或對其他氫離子幫浦抑制劑（esomeprazole、lansoprazole、rabeprazole 或 omeprazole）過敏。
- 2) 若有下列情況或病史，請確認已先告知您的醫師：骨質疏鬆症、低血鎂、懷孕或正在授乳、癲癇。
- 3) 請您將目前使用的藥品（包括市售成藥、各類營養食品以及中草藥等）告知醫師。尤其是服用抗黴菌藥（如：ketoconazole、itraconazole）、抗腫瘤藥（如：erlotinib、dasatinib 或 methotrexate）、抗病毒藥（如：atazanavir、nelfinavir）、抗排斥藥品 mycophenolate mofetil、抗凝血藥 warfarin、抗憂鬱藥 citalopram、抗生素 ampicillin 等。這些藥物與本藥併用會互相影響療效或增加副作用的嚴重度，請務必先告知醫師，讓醫師確認藥品如何開立。
- 4) 服藥期間若發生一直未改善的水瀉或嚴重腹瀉，請盡快回診諮詢醫師。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用，若發生，請於回診時告知醫師；但若症狀持續、加重，或已造成您的困擾，請提前回診告知醫師：
 - 頭痛、輕微腹瀉。

三軍總醫院 祝您健康快樂



- 2) 若您於服藥期間，發生下列罕見但較嚴重的副作用，請盡快就醫：
- 過敏反應：手、腳或腳踝、臉、嘴唇、舌頭及喉嚨發生腫脹，甚至造成胸悶、呼吸困難、刺痛。
 - 心跳過快、暈倒或是嚴重頭暈。
 - 嚴重腹瀉；肚子異常疼痛。
 - 肌痛、肌肉無力、關節痛或骨骼疼痛。
 - 身上異常出血或瘀青。
 - 痙攣。
- 3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。

保存方法：

- 1) 請您將本藥連同藥袋儲存於室溫陰涼乾燥環境，避免潮濕及陽光直射，不需冷藏或冷凍。
- 2) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 3) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 4) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。
- 5) 過期或不需使用的藥品勿直接丟棄於家用垃圾內，可詢問藥師如何處理。