



Primperan FC tab 5mg (腹寧朗膜衣錠)

學名：Metoclopramide HCl 膜衣錠

商品名：Primperan FC tab 5mg (賽諾菲安萬特)

中文名：腹寧朗膜衣錠

藥品外觀：白色，圓形錠，上有 634 字樣。

用途：抑制胃部肌肉鬆弛，加強副交感神經對胃部肌肉收縮之刺激作用，達到加速胃內食物排空至腸道中。預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

使用方法：

1. 通常成人 1 日 2~6 錠，分 2~3 次於飯前服用。實際用量請依照醫師之處方量使用，切勿自行增減藥量。
2. 請於飯前 30 分鐘服用。

忘了用藥怎麼辦？

當您記起時，請馬上補服。但如果想到時已差不多為下次服藥時間，請服用一次之劑量即可(省略一次)，切不可服用雙倍劑量。

注意事項：

1. 使用本藥前，請先告知醫師您正在服用之其它藥品及藥物過敏史。
2. 孕婦使用此藥需經醫師評估。
3. 授乳婦不宜使用本藥，請改用它藥或停止授乳。
4. 若您正在服用或用本藥前 14 天內曾服用單胺酶(monoamine oxidase)抑制劑，請勿使用本藥。
5. 老人及小孩(特別是在脫水及發燒時)較易出現錐體外副作用，請注意不可過量，並注意給藥間隔。
6. 有下列疾病者，請先告知醫師：肝或腎功能不好、高血壓、帕金森氏症、癲癇症、憂鬱症。

可能的副作用：

1. 偶有倦怠、思睡等副作用，駕駛或操作器械需小心。
2. 偶有頭痛、口乾、眩暈、不安、腹瀉、便秘等現象。
3. 下列症狀出現時，請立即與您的醫師連絡，尋求適當處置：
 - 過敏性反應：皮膚發疹等
 - 吞嚥困難、心搏過速、血壓變動



-無月經、持續性乳汁分泌、女性化乳房

-痙攣

-錐體外徑症狀：手指振顫、肌肉僵硬、頸和臉部攣縮、眼球回轉、焦躁感等症狀。

保存方法：

請將藥物置於兒童拿不到的地方。本藥應於室溫下陰涼乾燥處貯存。

解說醫師/藥師簽章：_____

日期：_____年_____月_____日

病人簽章：_____

日期：_____年_____月_____日