



Procil tab 50mg (普樂治錠)

學名：Propylthiouracil 錠

商品名：Procil tab 50mg (尼斯可)

中文名：普樂治錠

藥品外觀：白色，圓形錠，上有刻痕及 Nysco 字樣。

用途：本藥用於治療甲狀腺機能亢進症。

使用方法：

請遵照醫囑使用。通常本藥每日服用三次，大約每八小時一次。某些病患一日只要使用一次，每日最大藥量不超過 600 mg。

忘了用藥怎麼辦？

記起來時立刻服用，但若已接近下次用藥時間，則跳過一次，不可以一次使用雙倍劑量。

注意事項：

1. 孕婦應小心使用本藥。
2. 使用本藥前請告訴醫師您目前的用藥情況，特別是使用抗凝血劑如 warfarin (coumadin) 時。
3. 孕婦或嬰孩在服用前請告訴醫師。
4. 在急救或緊急手術前，需知會醫師或牙醫您有服用本藥。
5. 有肝臟疾病及出血性疾病者要特別留意使用。

可能的副作用：

服藥後最常出現的副作用為藥物疹，但若出現發燒及喉嚨痛、異常出血或瘀傷、甚至肝指數上升或黃疸時，請立刻停藥並與醫師聯繫。

保存方法：

本藥需放在小孩無法取得之處，並在陰涼、乾燥的環境下保存。

解說醫師/藥師簽章：_____

日期：_____年_____月_____日

病人簽章：_____

日期：_____年_____月_____日