



Seroquel FC Tab 25mg

(思樂康 膜衣錠)

學名：Quetiapine fumarate 膜衣錠

商品名：Seroquel FC Tab 25mg (阿斯特捷利康)

中文名：思樂康 膜衣錠

用途：精神疾病治療藥物，詳細用途或疑問請詢問醫師。

使用方法：

- 1) 一般建議睡前使用，可空腹或與食物併服。
- 2) 實際用法用量請遵醫囑使用。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，到下次原本預定服藥的時間再服藥，不可一次服用雙倍以上劑量。

注意事項：

- 1) 若您有下列狀況，不可使用本藥：曾經對本藥主成份 quetiapine 或其他成分過敏；曾有嚴重過敏情形者。
- 2) 此藥用於老年人失智相關症狀治療時，可能會引起腦血管及心臟方面的問題，若有相關疾病務必先告知醫師。
- 3) 本藥有可能會讓您情緒低落或有想自殺的念頭，請確認您的家人知道此事，當發現有出現行為改變、情緒劇烈變化或有想傷害自己的想法時，請務必告知你的醫師。
- 4) 若有下列情況，請確認已先告知您的醫師：有心血管疾病(如高血壓、心律不整、心衰竭等)、糖尿病、高血脂症、電解質不平衡(低血鉀、低血鎂)、肝臟疾病、甲狀腺疾病、中風、乳癌等；懷孕、預備懷孕或授乳⁴。
- 5) 請您將目前使用的藥品(包括市售成藥、各類營養食品以及中草藥等)告知醫師。尤其是服用鎮靜、安眠、降血壓藥(如：indinavir、ritonavir)、心律不症藥物(如：amiodarone、quinidine、sotalol)、抗病毒藥(如：indinavir、ritonavir)、抗癲癇藥(如：carbamazepine、phenobarbital、phenytoin)、抗感染(如：gatifloxacin、itraconazole、ketoconazole、moxifloxacin)或抗精神病藥物(如：chlorpromazine、ziprasidone)等。這些藥物與本藥併用會互相影響療效或增加副作用的嚴重度，請務必先告知醫師，讓醫師確認藥品如何開立。
- 6) 本藥使用期間，可能會發生頭暈或想睡的情形，在不確定本藥對您造成的影響前，請避免從事需警覺性、專注力及協調力的活動，例如開車或操作危險器械。

三軍總醫院 祝您健康快樂



- 7) 本藥可能造成姿勢性低血壓，由較低的臥或坐姿改變成站姿時請放慢速度並扶著穩固支撐物起身。
- 8) 服藥治療期間避免飲酒。
- 9) 使用本藥治療期間，醫師可能會幫您安排定期檢查，如眼睛或血液學檢查等，請務必在醫師為您安排的時間接受檢查。
- 10) 請不要突然停藥，您的醫師會依您的病情調整您的用藥劑量，請遵照醫囑用藥。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用，若發生，請於回診時告知醫師；但若症狀持續、加重，或已造成您的困擾，請提前回診告知醫師：
 - 便秘、腹痛、噁心、嘔吐、口乾。
 - 頭痛。
 - 疲倦、暈眩、或想睡。
 - 吞嚥困難。
 - 體重增加。
- 2) 若您於服藥期間，發生下列罕見但較嚴重的副作用，請盡快就醫：
 - 過敏反應：手、腳或腳踝、臉、嘴唇、舌頭及喉嚨發生腫脹，甚至造成胸悶、呼吸困難、刺痛。
 - 情緒或行為改變，煩躁不安，焦慮，心神不定，或想傷害自己或他人。
 - 嘴唇、舌頭、下顎、手腳出現持續性不自主的肌肉顫動。
 - 心跳太慢、太快或是不規則。
 - 發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、或身體疼痛。
 - 發汗、意識混亂、肌肉僵硬。
 - 排尿次數或排尿量增加、容易餓、口渴、虛弱。
 - 暈倒、頭暈、行動遲緩。
 - 癲癇。
 - 視力改變。
- 3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。

保存方法：

- 1) 請您將本藥連同藥袋儲存於室溫陰涼乾燥環境，避免潮濕及陽光直射，不需冷藏或冷凍。
- 2) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 3) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 4) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。

三軍總醫院 祝您健康快樂



三軍總醫院 Tri-Service General Hospital

宗旨：提供軍人、軍眷及民眾最優質的醫療服務。

願景：軍民之首選醫院、社區健康守護者、國際級醫學中心。

- 5) 過期或不需使用的藥品請依當地衛生主管機關規定處理或詢問藥師如何處理。

三軍總醫院 祝您健康快樂

