



Tofranil SC tab 25mg

(妥富腦糖衣錠)

學名：Imipramine 糖衣錠

商品名：Tofranil SC tab 25mg (臺灣諾華)

中文名：妥富腦糖衣錠

藥品外觀：橘紅色，圓形錠，上有CG、210樣。

用途：

本藥是一種抗憂鬱藥（情緒提升劑），被用來治療憂鬱症、焦慮症、小兒尿床以及緩解疼痛症狀等。

使用方法：

請遵照醫師指示，通常一天服用一次或超過一次的都有，空腹服用或與食物一起服用均可。不要自行增加或減少醫師處方的劑量，也不要任意增加服藥的次數。

本藥要按時持續使用幾個星期才會發揮完全的療效。雖然有時候覺得情況已經有所改善或情況已經不錯了，但還是要持續服用本藥。在沒有與醫師商討的情況下，千萬不要自行任意停藥。尤其是長期服用較大劑量的病人，更不可以自行任意停藥。醫師可能會以逐步降低劑量的方式來減量。

忘了用藥怎麼辦？

如果您一天服用兩次以上的藥，應該在您記起來時，立即服用那遺漏的一次劑量。並將當天剩餘要服用的劑量，依照等分的時間間隔來服用。然而，若已接近下次服藥的時間，則跳過一次，千萬不可以一次使用雙倍的劑量。

注意事項：

1. 請告訴醫師或藥師您是否對本藥或其他任何藥物過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物，或是過去兩個星期以來所服用過的藥物。
3. 請告訴醫師您是否患有或曾經有過青光眼、前列腺肥大、排尿困難、癲癇發作、甲狀腺機能亢進、或者有肝臟、腎臟、心臟方面之疾病。
4. 婦女若有懷孕或哺乳，在服用本藥前請教您的醫師。
5. 如果您將要動手術，包括牙科手術，均應告知醫師或牙醫師你正在服用本藥。
6. 服用本藥可能引起眩暈、嗜睡，應避免開車或操作危險的機械。



7. 切記酒精會增加本藥之嗜睡作用。
8. 如果您有抽煙的習慣，應告知您的醫師。因為抽煙可能會降低本藥的療效。

可能的副作用：

1. 常見的副作用有：胃部不舒服、嗜睡、虛弱或疲勞、躁動或焦慮、失眠、夢魘、口乾、皮膚對太陽光變的比平常更敏感、胃口改變或體重改變等等。
2. 若有出現便秘、排尿困難、頻尿、視線模糊、流汗過度等症狀時，應告知醫師。
3. 若出現顎、頸和頭部肌肉痙攣、言語變慢或言語困難、曳足而行、持續性細小震顫或無法坐著不動、發燒、呼吸困難或吞嚥困難、嚴重之皮疹、皮膚或眼睛發黃、心跳不正常等症狀，應立刻停藥，儘速與醫師聯絡。

保存方法：

本藥需放在小孩無法取得之處，並在陰涼、乾燥的環境下保存。

解說醫師/藥師簽章：_____ 日期：_____年_____月_____日

病人簽章：_____ 日期：_____年_____月_____日