



Ultracet Tab 37.5 mg/325 mg (及通安錠)

學名：Tramadol / acetaminophen 錠

商品名：Ultracet Tab 37.5 mg/325 mg (嬌生)

中文名：及通安錠

藥品外觀：黃色橢圓錠，一面刻有「JANSSEN」，另一面有「T/A」的字樣。

用途：本藥為作用於中樞之口服止痛藥，用來治療使用非鴉片類止痛劑無效的中度至嚴重性疼痛。

使用方法：

- 1) 空腹或隨餐服用皆可，請以足量飲水（約 240 西西）服藥。飯後服用可減少腸胃不適。
- 2) 實際用法用量請遵醫囑使用，切勿擅自增加用藥劑量或次數；每日總量不可超過 8 顆。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，到下次原本預定服藥的時間再服藥，不可一次服用雙倍以上劑量。本藥也有可能是需要時才服用，請依照醫師指示使用。

注意事項：

- 1) 若您有下列狀況，不可使用本藥：曾經對本藥主成分 acetaminophen、tramadol 或其他成份，或其他鴉片類製劑過敏；曾經對鴉片類藥物產生依賴性；正在服用單胺氧化酶抑制劑或是停用不足 2 星期；肝功能不良。
- 2) 若您有下列狀況，請確認已先告知您的醫師：有肝臟疾病、腎臟疾病、呼吸或肺部問題、癲癇、蠶豆症（G6PD 缺乏症）、頭部受傷、自殺傾向、用藥成癮等病史；有躁鬱症家族史；曾經發生嚴重藥物或食物過敏反應；有飲酒習慣或正服用含酒精藥物；授乳、懷孕或預備懷孕；計畫進行手術（包括牙科手術）。
- 3) 請您將目前使用的藥品（包括市售成藥、各類營養食品以及中草藥等）告知醫師。尤其是抗憂鬱藥物（如：選擇性血清素再吸收抑制劑、三環抗鬱劑）、抗精神病藥物（如：chlorpromazine、haloperidol）、治療偏頭痛藥物 sumatriptan、抗凝血劑 warfarin、抗痙攣藥（如：carbamazepine、barbiturates）、抗黴菌藥 ketoconazole、抗生素 erythromycin、抗生素 linezolid、抗帕金森氏症藥物 selegiline、心律異常治療藥物 digoxin 及 admiodarone、thiazide 利尿劑（如：trichlormethiazide）、尿酸藥 probenecid、抗腫瘤藥（如：dasatinib、imatinib、sorafenib）、抗結核藥（如：isoniazid、rifampin）、聖約翰草（St. John's Wort，又名金絲桃）等。這些藥物與本藥併用會互相影響療效或增加副作用



- 發生機率或嚴重度，請務必先告知醫師，讓醫師確認藥品如何開立。
- 4) 服用本藥可能會使您頭暈或者昏昏欲睡。在確認本藥對您造成的影響前，請避免開車、操作機械或從事其他需保持警覺或專注力的工作或活動。
 - 5) 本藥可能造成姿勢性低血壓，由臥或坐等較低姿勢要起身時請放慢速度。爬樓梯時請小心握著扶手上樓。
 - 6) 除非您的醫師特別指示您必須限制水份的攝取，否則服藥期間請多補充水份以預防便秘。
 - 7) 酒精會加強本藥的中樞神經抑制及肝毒性的副作用，服用本藥治療期間請避免飲用含酒精的飲料及食物。
 - 8) 服藥期間若有情緒激動、精神紊亂、出汗、幻覺等情形發生，有可能是藥物引起的血清素症候群，應盡快就醫診察。
 - 9) 本藥不要與其它含有 tramadol 或 acetaminophen 的止痛藥品一起服用。避免因過量而增加藥物的副作用或毒性。
 - 10) 長期服用本藥者若突然停用可能會發生戒斷症狀（如焦慮、腹瀉、噁心、震顫等），若需停藥，應依醫師指示以逐漸減少劑量的方式停藥，切勿自行停用本藥。
 - 11) 若您認為自己或他人可能服用本藥過量，請立即前往急診室就醫。用藥過量的徵兆包括痙攣（癲癇發作），呼吸困難，呼吸不規律，呼吸急促或緩或短淺，嘴唇、指甲或皮膚發白或發紫，瞳孔呈針孔狀。
 - 12) 使用本藥治療期間，醫師可能會幫您安排定期回診評估。請務必在醫師為您安排的時間回診。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用，若發生，請於回診時告知醫師；但若症狀持續、加重，或已造成您的困擾，請提前回診告知醫師：
 - 頭暈，嗜睡。
 - 頭痛。
 - 口乾。
 - 胃部不適或嘔吐（可用少量多餐，保持口腔衛生，含無糖硬糖果或嚼無糖口香糖來改善）。
 - 便秘（多喝水、做運動或增加飲食中纖維攝取對改善便秘可能有幫助）。
 - 腹瀉。
 - 出汗增多、輕度瘙癢。
 - 失眠。
- 2) 若您於服藥期間，發生下列罕見但較嚴重的副作用，請盡快就醫：



- 過敏反應：皮疹，蕁麻疹，瘙癢，皮膚紅腫，起水泡或脫皮；臉、嘴唇、舌頭或喉嚨發生腫脹，胸悶、呼吸困難。
- 出現情緒低落（抑鬱）、有自殺意圖、精神緊張、情緒起伏、焦慮以及對生活感覺無趣。
- 嚴重暈眩或昏厥。
- 呼吸困難。
- 思慮的清晰度及邏輯性產生變化。
- 疼痛控制不佳。
- 嚴重腹痛或嘔吐。
- 皮膚或眼白泛黃。
- 食慾不振，食量變少。
- 異常疲倦或虛弱。
- 深色尿或大便呈灰白色。
- 尿濁、排尿困難、尿量突減。
- 癲癇發作。
- 嚴重便秘。

3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。

保存方法：

- 1) 請您將本藥連同藥袋儲存於室溫陰涼乾燥環境，避免潮濕、熱源及陽光直射。
- 2) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 3) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 4) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。
- 5) 過期或不需使用的藥品勿直接丟棄於家用垃圾內，可詢問藥師如何處理。