

“人人”安 胃錠

制酸·排氣·消脹

衛署藥製字第 018365 號

成分：

本品每錠含有下列主成分，為高能量之制酸、排氣、消脹劑。

Aluminum hydroxide dried gel.....400mg

Magnesium hydroxide.....400mg

Simethicone.....30mg

作用：

本品對於制止胃酸過多、排除由於胃潰瘍而蓄積之脹氣、以及其他症狀而肇致之胃酸分泌過盛，均具良好之治療效果。本品特有之高度制酸能量係因含有無鈣質之高濃度抗酸成分以致之，故可中和胃酸快速而持久，而不會有碳酸鈣劑之產生續發性胃酸增高之弊。本品所含之矽劑成分則具有排氣消脹之效。

適應症：

緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良，解除脹氣，緩解氣脹相關症狀。

副作用：

1. 含鎂之制酸劑可能會引起腹瀉。
2. 含鋁之制酸劑可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。

警語：

1. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，對於牛奶或乳製品過敏者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過 5gm。
2. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，一天內不可服用超過每日最大劑量之制酸劑，也不可連續服用每日最大劑量兩週以上。
3. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，未滿 3 個月之嬰兒不得服用。
4. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，每日最大建議劑量含鎂量超過 50mEq(600mg)或含鉀量超過 25mEq(975mg)鉀之制酸劑，腎疾患者不要服用。
5. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，每日最大建議劑量含鈉量超過 5mEq(115mg)之制酸劑，須限鹽飲食之患者不服用。
6. 內服錠劑應嚼碎後吞服。
7. 如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用制酸劑。
8. 消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
9. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，制酸劑不得併用其他藥品。

注意事項：

1. 須置於小孩接觸不到之處。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

用法用量：

成人一天 3 次，每次一錠，飯後 1 小時及睡前或需要時服用。

12 歲以上，適用成人劑量。

6 歲以上未滿 12 歲，適用成人劑量之 1/2。

3 歲以上未滿 6 歲，適用成人劑量之 1/4。

3 歲以下之嬰幼兒，請洽醫師。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

包裝：

6~1000 粒瓶裝，PE 玻璃紙盒裝。

GMP



人人化學製藥股份有限公司
中壢市南園二路三號