

衛署藥製字第 038229 號

“中國化學”

葡萄糖酸鈣注射液 10%

Calcium Gluconate Injection 10%

“C.C.P.C.”

網號：Q60

本品為鈣的補充劑，且葡萄糖酸鈣為有機鈣鹽及易為人體吸收。

成分：每毫升中含有：

Calcium gluconate.....96.1mg
(0.465 meq of Ca^{++} per ml provided by Calcium gluconate and Calcium saccharate stabilizers)

作用：補充鈣離子。

適應症：鈣不足引起之手足搐搦、膽囊及輸尿管絞痛、枯草熱、蕁麻疹、妊婦哺乳時之鈣補給。

用法：本藥限由醫師使用。

1. 每回 1.83~9.17meq, 1 日 1 回, 每分鐘 0.68~1.36meq 緩慢靜脈注射; 亦可加入 500 毫升之輸注液, 點滴靜注。

2. 200 毫升裝, 僅供全靜脈營養輸注液調配使用。

注意事項：

1. 不得使用於腎不全之低鈣血症患者, 毛地黃配醣體正服用之患者。
2. 甲狀腺機能亢進者, 應小心使用。
3. 有增強子宮收縮劑之作用。

4. 本注射液與酒精接觸會生沈澱, 故待附著於注射器內部之酒精揮發後, 方可使用。

5. 本品須保持澄清狀態, 方可使用。

6. 200 毫升裝, 禁止直接使用於靜脈注射。

7. 本劑含有總鈣量為 0.465meq/ml, 以 Calcium d-saccharate 當本劑的安定劑, 其所攜帶的鈣量一併合計於總鈣量中。

8. 取用時：

(1) 運輸過程中, 容器可能因受重擊、震動, 而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時, 請勿使用。

(2) 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時, 請勿使用。

9. 輸液套選用及插入法：

(1) 請依輸液套使用方法正確使用。

(2) 請使用附有過濾裝置之輸液套, 導入針應以垂直方式插入橡皮塞, 插入後請勿扭轉, 以免因針割(Coring)產生碎片。

(3) 使用前請再檢視, 確定無異物後, 方可使用。

10. 因本品為飽和溶液, 若遇有結晶析出時, 請勿使用。

貯存：室溫避光貯存。

包裝：200 公撮瓶裝, 100 支以下裝。



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：

(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號