

“景德” 抗憂佳膠囊20毫克 (富魯歐西汀)

KINXETIN Capsules 20mg (Fluoxetine)

“Kingdom”

【主成分】

每膠囊含：

Fluoxetine (Hydrochloride).....20mg

【藥理作用】

- 1.本品是一種合成的抗憂鬱藥品，能有效治療憂鬱患者。
- 2.本品能抑制腦中前突觸神經 (Presynaptic neuron) 對Serotonin (5HT-1) 這種神經傳導物質的回收 (Uptake of serotonin neurotransmitter)，而使腦中Serotonin濃度增加，而Serotonin濃度的增加具有抗憂鬱作用。所以本品具有抗憂鬱的作用。

【適應症】

抑鬱症、暴食症、強迫症。

【用法用量】

- 1.起始劑量為一天20mg，早上一次給予。
- 2.若服用本品數星期後仍沒有療效或產生抗藥性，則可考慮增加劑量，但一天最大劑量不得超過80mg。
- 3.若給予劑量超過20mg時，則建議應分為二次給予，一次為早上給予，一次為中午給予。
- 4.腎功能不全患者，肝功能不全患者，老年患者或正服用多種藥品患者，則應視實際需要而減低劑量。

本藥須由醫師處方使用。

【過量處理】

- 1.由於本品並無有效之解毒劑，故僅能給予支持性療法或儘量加速本品由體內排出。
- 2.維持呼吸道的通暢，並給予充足的氧氣。
- 3.給予活性碳 (Activated Carbon可並用Sorbital) 吸收本品，其解毒效能有時比催吐劑或洗胃更有效。
- 4.監測心臟功能並注意維持維生系統。
- 5.進行尿析 (diuresis)、透析 (dialysis)、血液透析 (hemoper fusion) 及交換性透析 (exchange transfusion)，以加速本品排出。
- 6.服用本品時發生中毒症狀時，有時有亦和服用其他藥品 (例如併服TCA藥品) 而導致有關，故應合併處理其他藥品所產生的中毒症狀。

【禁忌】

- 1.對本品過敏者，應避免服用本品。
- 2.本品和單氧化，抑制劑 (Monoamine oxidase inhibitor,MAOI) 會互相加重副作用而導致致死現象。故本品和單氧化，抑制劑不得併用，服用單氧化抑制劑後14天內不得服用本品，服用本品5星期內不得使用單氧化抑制劑。

【警告】

由於本品時會引起過敏反應或類似過敏反應 (如發疹、搔癢、發燒、白血球過多症、關節痛、水腫、呼吸困難等)，一但出現此等反應，則應立即停藥。

【注意事項】

- 1.使用本品時會有焦慮失眠 (Anxiety and Insomnia)、胃口改變及體重減輕 (Altered Appetite and Weight)、輕躁狂症及躁狂症 (Activation of Mania/Hypomania)、癲 (Seizures) 及自殺傾向 (Succide)，故若有以上傾向者，應減低服用劑量。
- 2.由於本品及其代謝物的排泄半衰期長 (The Long Elimination Half-Lives of Fluoxetine and It's Metabolites)，故有時在使用本品後數星期後，其血中濃度仍不能反應真正的所需濃度，故切勿因血中濃度不夠而任意加大劑量，而應視真正需要而增減劑量。
- 3.若患有下列疾病者，應小心調整劑量。
 - (1)心臟疾病患者，應在醫師指示下才可服用本品。
 - (2)肝功能不全患者，服用本品時其血中濃度會較正常人為高，故應減低劑量且小心服用。
 - (3)腎功能不全患者，服用本品時其血中濃度會較正常人為高，故應減低劑量且小心服用。
 - (4)服用本品時，會減低血中血糖濃度。故糖尿患者在服用本品時，應注意服用本品時所造成的血糖過低及停藥時所造成的血糖過高。
- 4.本品會影響認知力及操作能力 (Interference With Cognition and Motor Performance)，所以需操作機器或開車者，應小心使用本品。
- 5.藥物交互作用

藥物	交互作用
Fleccainidine Viblastine, Card Bamazepine. Tricyclic Antidepressant	由於右列藥物會減低肝臟P-450之代謝而增加本品之血中濃度而增加毒性,故在一開始使用本品時應減低劑量。
Trptophan	Trptophan會加強本品之副作用。
MAOI	MAOI不可和本品併服。
其他抗憂鬱藥物	會加重本品之作用及毒性。
鋁製劑	會影響本品之血中濃度。
Diazepam. Phenytoin	本品會加重diazepam, phenytoin的血中濃度。
和血中蛋白結合力強之藥物 (如Coumdin, Digitoxin)	會將血中蛋白結合之本品置換出來,而增加本品之血中濃度。
中樞神經刺激劑	會加強本品之作用。

6.懷孕婦女或欲懷孕婦女、哺乳婦女應避免服用本品。

7.老年人及小孩服用本品時,應減低劑量服用。

【副作用】

- 1.中樞神經系統：頭痛 (headache)、緊張 (nervousness)、失眠 (insomnia)、嗜眠 (drowsiness)、焦慮 (anxiety)、顫抖 (tremor)、暈眩 (dizziness)、疲勞 (fatigue)、鎮靜 (sedated)、感覺受擾 (sensitization)、性慾減少 (libido decrease)、遇光頭痛 (lightheadedness)、注意力減退 (concentration decrease) 等。
- 2.胃腸道系統：噁心 (nausea)、腹瀉 (diarrhea)、口乾 (mouth dryness)、厭食 (anorexia)、消化不良 (dyspepsia)、便秘 (constipation)、腹痛 (abdominal pain)、口覺改變 (taste change)、嘔吐 (vomiting)、胃脹氣 (flatulence)、胃腸炎 (gastroenteritis) 等。
- 3.皮膚及四肢：流汗過多 (sweating)、發疹 (rash)、搔癢 (pruritis) 等。
- 4.全身部位：衰弱 (asthenia)、病毒感染 (viral infection)、肢體疼痛 (limb pain)、胸痛 (chest pain)、過敏 (allergy)、感冒 (influenza) 等。
- 5.呼吸系統：上呼吸道感染 (upper respiratory infection)、Flu-like症候群 (Flu-like syndrome)、咽炎 (pharyngitis)、鼻塞 (nasal congestion)、竇炎 (sinus sinusitis)、咳 (cough)、呼吸困難 (dyspnea) 等。
- 6.心血管系統：發紅發熱 (hot flushes)、心悸 (palpitation) 等。
- 7.骨骼肌肉系統：背痛 (back pain)、關節痛 (joint pain)、肌肉痛 (muscular pain)。
- 8.生殖系統：經痛 (menstruation pain)、性功能失常 (sexual dysfunction)、陽萎 (sexual impotence)、頻尿 (frequent micturition)、泌尿道感染 (urinary infection) 等。
- 9.感覺異常：視覺障礙 (vision disturbance) 等。
- 10.血液淋巴系統：淋巴腺病 (lymphadenopathy) 等。
- 11.營養代謝系統：體重減輕 (weightloss) 等。

【賦形劑】

Corn Starch、Aerosil、HPMC 615

【膠囊殼成分】

Gelatin、Purified Water、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate Tartrazine、Brilliant Blue FCF、Glycerine、New Coccine、Sunset Yellow FCF。

【貯存】

本品應於15~30℃以下避光貯存。

【包裝】

2~1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第041280號



委託者：景德製藥股份有限公司
 地址：台北市中山區中山北路二段113號8樓
 製造廠：健康化學製藥股份有限公司
 廠址：台中市大甲區幼獅工業區幼四路12號