

喜療妥[®] 乳膏

Hirudoid[®] Cream

衛署藥輸字第 014993 號

成份：

100 g of cream contain:

Mucopolysaccharide polysulfate
(organo-Heparinoid" Luitpold") 25000 U.

適應症：

對局部腫脹之輔助治療，其明確療效仍待建立。

用法用量：

本藥須由醫師處方使用。

每天一次或二次，在患處擦上 3 至 5 公分長之藥膏，再小心按摩。

如因局部腫脹引起痛楚，可在患處四週敷上喜療妥再用繃帶包紮妥當，同時亦可用喜療妥按摩患處附近，以增加療效。

如作軟化疤痕用，乳膏應用力擦在患處。

如患處經塗喜療妥後仍有流血現象時，可用原胺類硫酸鹽止血。

欲得更滿意療效，可請教合格醫師或藥師。

注意事項：

1. 禁忌：(1) 出血性血液疾患(如血友病、血小板減少症、紫斑症)禁用；(2) 雖僅有少量出血，然有引起重大變化之虞者禁用。
2. 副作用：過敏症有發赤、發疹等現象發生，應終止使用本劑。
3. 使用上之注意：(1) 避免使用於潰瘍、潰爛之皮膚及眼睛；(2) 於室溫避光保存。

包裝：

分 14 公克、40 公克及 100 公克管裝

製造廠：德國三共藥廠 SANKYO PHARMA GmbH

廠址：Zielstattstraße 9, 81379 Munchen,
Federal Republic of Germany

藥商：友信行股份有限公司

台北市敦化南路 2 段 97 號 14 樓

TEL：02-2706-2121, 02-2708-6096