

樂 多 糖漿 666 公絲/公撮(拉特樂斯)

LACTUL Syrup 666mg/ml(Lactulose) ^{® Sinphar}

緩 瀉 劑

Lactulose 是一種雙醣類，由 Galactose 和 Fructose 組合而成，它幾乎不被消化道吸收，且不具熱能，在被腸內細菌分解後形成低分子量的有機酸 acetic acid、lactic acid，能酸化腸內容物，當腸內容物的酸度大於血液時，會將血液中的 NH₃ 轉移至腸道中形成 NH₄⁺，並限制其再吸收回血液中，而導致緩瀉作用，並可治療及預防 Portal-systemic encephalopathy。以 Lactulose 治療病患時，通常可發現其蛋白質耐受性會增高。

成份：每 mL 含：

Lactulose.....666mg

適 應 症：患病期慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷。

用法用量：

1.治療便秘：成人一天 15~30mL，需要時可增加到 60mL 每天，24~ 48 小時內會恢復正常的腸蠕動。

2.治療預防 Portal-systemic encephalopathy：

口服：成人：一日三~四回，一回 30~45mL

嬰兒：一日劑量，2.5~10mL

小孩：一日劑量，40~90mL

持續劑量則依個人的反應，再作增減。

直腸灌腸：本品 300mL 以 700mL 之水或生理食鹽水稀釋，放置 30~60 分鐘。

注意事項：

1.因本品含少量的 galactose 及 lactose 所以糖尿病患及半乳糖血症(galactosemia) 病患，須小心謹慎給藥。

2.本品可使用於孕婦及小孩，但嬰兒在使用 Lactulose 時可能會引起低血鈉症 (hyponatremia)及脫水症狀。

3.本品不具成癮性。

4.用藥過量時可能產生脫水、低血鉀症、低血鈉症、噁心、嘔吐等症狀。

5.避光及室溫(15~30°C)貯存。

6.在室溫良好條件貯存下，顏色變深並不影響療效。

7.長期置於 30°C 以上或光直射時，易變成極深色及混濁，當此現象發生時，請勿再用；長期置於冷凍溫度時，呈半固體狀、變稠、不易倒出，但恢復至室溫時，即可恢復原狀，不影響療效。

8.請置於孩童不易取得處。

9.如覺口味不適時，可與果汁、白開水、牛乳混合後使用。

10.用 Lactulose 治療之病患，需要作電燒處置或作大腸直腸鏡檢時有理論上的危險性；由於若氫氣累積到相當濃度時，電氣火花可能會引發爆炸反應，因此可充氣 CO₂ 作為額外安全處理。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第 039701 號

G-5196 號

包 裝：30~4000 公撮塑膠瓶裝。