

“傑威” 歐力彼樂錠

Oribira Tablets “Jie Wei”

衛署藥製字第 25224 號

【成份】每錠中含：

Probenecid.....500mg

Colchicine.....0.5mg

【作用】(1)Probenecid：抑制腎臟對尿酸鹽之重吸收作用，促進尿酸鹽之排泄，口服作用迅速，40 分鐘以內呈現作用，4 小時可達最高量之尿酸排泄，故血清中尿酸值可於 24 小時之內降低，解除急性痛風發作之次數及程度，解除關節疼痛、腫脹。

(2)Colchicine：百合科植物秋水仙之種子或球莖中所提得之一種生物鹼，其中樞性之知覺麻痺作用及末梢血管麻痺作用及抑制尿酸之蓄積及炎症，適於痛風及痛風性關節炎之急性發作。

【適應症】痛風

【用法·用量】通常成人每日一次，一次一錠，繼續一週，然後每日二次，一次一錠。

痛風症患者每日服用 1~2 錠，可有效抑制痛風引發之疼痛，連用六週可於血中檢出尿酸值明顯降低。

【本藥須由醫師處方使用】

【副作用】偶有頭痛、食慾缺乏、噁心、嘔吐、尿頻繁、過敏性反應（包括類過敏性、皮膚炎、瘙癢、發燒）、潮紅、眩暈、貧血、溶血性貧血。

【禁忌症】(1) 對本藥過敏者。(2) 尿酸性腎臟結石。(3) 兩歲以下兒童。

Precautions：

1. 具有血尿症、腎疝痛、肋與椎骨痛和尿石症的痛風患者，若用 Oribira 來治療會阻礙尿的鹼化和自由的流入。
2. 有胃潰瘍患者使用本劑需小心。
3. Oribira 若用來治療腎損耗患者則其藥量須增加。
4. Oribira 若用來治療慢性腎病者，但其血管球的流動速率是 30ml/min 或更小時將無效用。
5. 一種還原物質可能出現在患者的尿意再吸收 Probenecid 若要其消失，須停止用藥。

Adverse reactions：

1. 使用 Probenecid 有時會有下列之現象，如頭痛、胃腸病狀、(神經性厭食、嘔吐、頻尿、過敏反應)，(如過敏性皮膚炎、瘙癢病症發燒)、膠瘡、潮紅眩暈、貧血。
痛風患者易尿酸結石而形成尿腎疝痛，和肋與椎骨痛而腎的徵狀群，肝壞死，不良貧血則較少。
2. 在一些病例中發現有紅血球溶解性貧血的現象，其血液細胞中的 Glucose-6-Phosphate dehydrogenase 有缺乏之現象。
3. 由於秋水仙素的旁效應顯現在藥量的運用而其突出的徵狀是在胃腸方面（如厭食、嘔吐、腹痛、下痢）而最大麻煩是在消化性潰瘍或痙攣性的結腸病。
4. 在 Colchicine 的有毒劑量夏可能引起下痢、血管和腎的損耗引起血尿、肌肉無力，若有此現象，就須停藥。
5. Colchicine 是很少引起過敏，(如蕁麻疹、皮膚炎、紫癍病)但須牢記一出現此現象就須停藥。
6. Colchicine 長期連用，可能引起粒性白血球缺乏症、不良性貧血和末梢中神經炎和頭髮稀少。
7. 有肝障礙患者，須慎重投藥。

【警語及注意事項】

1. 用本劑治療而引起痛風加劇在這種情況下可增加 Colchicine 或改用其他較適當的治療法。
2. Probenecid 在動物和人體內可增加 Methotrexate 的血中濃度，當二者同時使用時 Methotrexate 的用量須減少且注意血漿的水平。
3. 若有用本劑，和柳酸排泄物因此 Salicylates 的二相反應在腎小管中被稱為「自相矛盾」論反應。
4. 使用本劑時須藥止痛時用 Acetaminophen 比用 Salicylates 較適合，若有過敏現象，須立刻停止。
5. Colchicine 被報告對動物的精子生成有反作用，且有患者被證實有無精子的現象。
6. 本藥不要與水楊酸藥物併用，因為會拮抗本藥的降尿酸排除作用。

【藥物交互作用】

1. Probenecid 在尿酸排泄作用裏，亦可作為結核病劑止痛劑。
2. Probenecid 和 Sulfonamid 會相互作用而延長藥效一段時間使口部的硫化尿酸型為延長而增加產生低血醣的危險性。
3. Probenecid 會提高 Indomethacin 在血中濃度因此用量的 Indomethacin 即可產生治療效果，故使用時須小心且若有增加的必要時請微量。
4. Probenecid 亦可增加 Rifamycin 在血中濃度。
5. Probenecid 亦可增加 Methotrexate 在血中濃度。
6. Probenecid 亦可增加 Theophylline 在血中濃度，此項研究報告是錯誤的。

【賦形劑】 hydroxypropyl cellulose-L, PVP K30, propylene glycol, silicon dioxide, compritol 888 ato, starch 1500, croscarmellose sodium, dicalcium phosphate, magnesium stearate, sunset yellow FCF

【包裝】 4~1,000 粒 鋁箔盒裝。 100，200，500，1,000 粒 瓶裝。

委託商：傑威生醫科技股份有限公司

製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

地址：台北市內湖區基湖路 35 巷 51 號 7 樓-1

地址：台中市南屯區工業區二十三路 21 號