

# “鼎泰” 舒眠諾思 膜衣錠 10公絲

## SEMI-NAX F.C. Tablets 10 mg "D.T."

□成分：Each F.C. tablet contains：

Zolpidem Hemitartrate ..... 10 mg

□適應症：

失眠症。

□用法用量：本藥須由醫師處方使用。

一般劑量：65歲以下成人—睡前1錠。

65歲以上成人—初劑量以1/2錠睡前給藥。每日請勿超過1錠。

通常短期間給藥治療。

所有的病例均須嚴守醫師處方。

口服給藥。

□注意事項：

1.禁忌：本品不可用於15歲以下孩童、孕婦及授乳婦。

2.一般之注意事項：

(1) 失眠可能會由各種原因所造成，不一定需要藥物治療。

(2) 如同其他的安眠藥，長期服用本品通常是無益且不被推薦的。

(3) 在服用睡眠誘導劑後，若於夜間起床，其危險性有：a.若於可能性的跌倒時，反應時間減慢；b.暈眩的感覺。

3.應用時之注意事項：

(1) 有下列任何情況時，應通知您的醫師：腎臟或肝臟疾病、呼吸困難、肌肉疾病（重症肌無力症：醫師必須更加注意此病例）。

(2) 老年病患應小心使用。

(3) 在整個療程中，禁止飲用含酒精的飲料。

(4) 注意本藥對於駕駛人及機器操作者可能會導致嗜眠的危險。

(5) 請將藥品置於小兒無法觸及的地方。若有任何疑問，請立即洽詢您的醫師或藥師。

4.交付藥物時之注意事項：

(1) 本藥可能不適用於另一病症。

(2) 除了醫師的建議外，請勿重複使用本藥。

(3) 請勿將本藥介紹給他人使用。

□副作用：

如同其他的活性成分，在某些人中，本藥會引起或多或少的不適感，如暈眩、嗜眠、噁心、頭痛、記憶障礙、夜間不安、腹瀉、跌倒。


在服藥過程中，若發生任何異常的反應，皆應向醫師報告。

□交互作用：

當服用超過一種藥物時，為避免產生可能的交互作用，您必須例行地向您的醫師或藥師報告您所服用的藥物，特別是和其他中樞神經系統抑制劑或任何含酒精成分的藥物共同服用時。

□儲藏：本品應於室溫下避熱及避濕貯存。

□包裝：2~1000粒塑膠瓶裝或鋁箔盒裝。

本品鋁箔標誌： S.N. 10

衛署藥製字第 044463 號

G.M.P.:G-7540



製造廠：南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南縣新化鎮中山路1001號

TEL：(06)5984121(代表) FAX：(06)5981845



委託製造者：鼎泰藥品股份有限公司

高雄市三民區延吉街63巷13號

TEL：(07)3824050 FAX：(07)3825111