

# Suzin Suzin Suzin

“生達”

# 舒腦

膠囊 10毫克

(服納利林)

## Suzin

Capsules 10mg "Standard"  
(Flunarizine)

【成分名】Flunarizine

【主成分】

Each capsule contains:

Flunarizine 2HCl ..... 11.8mg  
(equivalent to flunarizine.....10mg)

【臨床藥理】

Flunarizine 為一選擇性的鈣離子阻斷劑，能防止細胞內鈣離子之過份負荷，但不影響心臟及血管平滑肌細胞之正常鈣離子通路。Flunarizine 從消化道吸收良好，大部份由肝臟代謝，其代謝物經由膽汁從糞便中排泄。

【適應症】

噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

一般成人劑量：

預防暈車、暈船：旅遊前服用10 mg。

一般兒童劑量：劑量尚未確立。

【注意事項】

1. 很少患者會於本藥治療期間發生疲倦且逐漸嚴重的現象，若此情形發生，須停止用藥。
2. 不可超過建議服用劑量，長期維持劑量之患者，須定期回診檢視，以便即早發現錐體外症狀及抑鬱等症狀而停止用藥。而若發現治療效果逐漸不明顯，亦須停藥。
3. 於人類懷孕期間使用本藥之安全性報告尚未建立。於動物研究顯示，本藥對懷孕各過程或現象（包括對胚胎或胎兒，受孕之過程，產前或產後發育）不產生直接或間接之副作用。
4. 本藥可從狗乳汁中分泌出，且Flunarizine於乳汁中之濃度高於血漿，目前尚無Flunarizine於人體乳汁中分泌之數據，但仍不建議授乳期之婦女使用本藥。
5. 過量：  
基於Flunarizine藥理學上之特性，在過量下嗜睡及無力感應當會出現，很少有急性過量的現象被報告，曾有一次服用600mg，其症狀為嗜睡，紊亂及心悸。Flunarizine沒有特殊之解毒劑，其處理方式為輔助療法，包括服用活性碳、洗胃或嘔吐。
6. 開車或操作機械：  
由於會產生嗜睡現象，特別是在治療之初，所以需要駕車或操作危險機械的患者服用本劑時應小心。
7. 禁忌：  
有抑鬱病史之患者，或目前有帕金森氏症之患者，及其他錐體束外異常之患者。

【相互作用】

當本藥與酒精、安眠藥，或鎮靜劑合用時會產生過度鎮靜現象。本藥未發現與Beta-blocker產生配合禁忌。

【副作用】

最常見的副作用為嗜睡或疲倦，但都是暫時性的，以及體重增加或食慾增加。

下列為於慢性治療期間可能發生較嚴重之副作用：

抑鬱--尤其是有抑鬱病史之女性患者，其危險性更高。

錐體束外的症狀--如運動遲鈍、靜坐不能，口部及顏面運動困難、震顫，年紀較大者危險性較高。

較少發生之副作用有：

消化系統--胸口灼熱、噁心、胃痛。

中樞神經系統--失眠、焦慮。

其他--口乾、肌肉痛、皮膚發紅。

【包裝】

2~1000粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【貯存】

15-30°C，避光貯存。

置於兒童不及之處。

衛署藥製字第029575號 G-0601 Code No. CS-06 2215210

藥商：

c G M P 藥廠

生達化學製藥股份有限公司

台南縣新營市土庫里六之二十號

製造廠：

c G M P 藥廠

生達化學製藥股份有限公司二廠

台南縣新營市開元路154號

