



肌弛緩·鎮痛劑

TFT-004
衛署藥製字第029090號

痛福[®]

Tonful[®] Tablets

錠

Tablets

由於近代文明的進步，而使生活日趨複雜，因而使我們經常有原因不明的肩部僵硬、背痛、腰痛等現象發生，又由於近年來運動風氣的盛行，因此對於人體各部的肌肉疼痛、扭傷等症狀年有增加，所以對肌肉弛緩劑的研究也非常的盛行。

本藥採用與Meprobamate構造類似且具有中樞性肌弛緩及鎮痛作用之Carisoprodol為主劑，再配以Paracetamol，而由於其協力作用對肌肉疼痛、肌肉緊張之治療能顯出優異的治療效果。

【成分】 每錠中含：

Carisoprodol.....175mg
Paracetamol.....350mg

【賦形劑】

Hydroxypropylcellulose、Sodium starch glycolate、Magnesium Aluminosilicate、Talc、Magnesium Stearate、Potato Starch、Sunset Yellow FCF。

【作用】

1. Carisoprodol具有肌肉弛緩作用，對一般肌弛緩劑所無效之大腦切除性肌僵硬之治療卻有效果，其對中樞神經之作用能除去疼痛，但不阻止末梢神經的反射。
2. Paracetamol為非比林系之鎮痛、解熱劑，能迅速降低疼痛感，亦能解除局部之炎症性腫脹、發熱，而不妨害正常的體溫調節。
3. 本藥為綜合了Carisoprodol的中樞性肌弛緩作用與Paracetamol的鎮痛、解熱作用而成的製劑，能雙管齊下地阻斷由緊張—痙攣—疼痛的惡性循環所導致的肩膀僵硬、腰酸背痛等肌肉之痙攣、疼痛之現象而有療效。

【適應症】

神經痛、關節痛、腰痛、背痛、扭傷、肌肉痛、脊椎炎、肌肉痙攣、關節周圍炎、斜頸。

【用法·用量】

通常成人1日3次，每次1~2錠。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

1. 先前對Paracetamol、Carisoprodol及其他相關藥物如，Meprobamate產生過敏或特異性反應之患者禁用之。
2. 不可與酒精、催眠藥、鎮痛劑或安神藥等中樞抑制劑併服，以免產生作用加成或中毒現象。
3. 嚴重腎功能不全者禁用本藥。

【注意事項】

- (一) 先前肝功能不全者應小心使用。
- (二) 本藥可能會降低患者之反應能力。因此，治療期間應避免操作危險性機械或開車。
- (三) 由於本藥之化學結構類似於Meprobamate，故罹患吡咯紫質沉着症之患者應謹慎使用。
- (四) 12歲以下之兒童不建議使用本藥。
- (五) 肝毒性：
 1. 使用acetaminophen (paracetamol)曾有發生急性肝衰竭的案例，並可能導致肝臟移植及死亡。大部份發生肝臟損害之病例係因使用超過每日4,000毫克的acetaminophen所致，且多涉及使用超過一種以上含acetaminophen成分之藥品。
 2. 過量服用acetaminophen可能是因想要獲得更大的疼痛緩解效果，或是在不知道的情況下同時使用了其他同樣含有acetaminophen成分之藥品，因而造成用藥過量。
 3. 有潛在肝臟疾病的病人，以及於使用acetaminophen期間喝酒者，有較高發生急性肝衰竭的風險。醫療人員應囑咐病人，病人亦應注意藥品的標示中是否含有acetaminophen或paracetamol成分，不可同時使用超過一種以上含有acetaminophen成分之藥品。如果一天誤服超過4,000毫克的acetaminophen，即使並未感覺不適，也應立即就醫。
- (六) 與酒精併用：

不得併服含酒精飲料，因為acetaminophen可能造成肝損害。慢性重度酒精濫用者亦可能會因過度使用acetaminophen而增加肝毒性危險，本品不應與酒精併用。
- (七) 過量：
 1. 服用過量acetaminophen會在服藥24小時內看到初期症狀，可能包括：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、不適、蒼白及出汗。
 2. 本品單次或多次過量使用有潛在的藥物成癮或濫用之可能，情況允許下，建議諮詢適當的專家。

3. **Acetaminophen** 過量最嚴重之不良反應為致命性之肝臟壞死。亦可能發生腎小管壞死，低血糖昏迷以及凝血異常之不良反應。用藥過量之肝毒性早期症狀可能包括：噁心，嘔吐，出汗和全身不適。肝毒性的臨床及實驗室證據可能要等到攝入後48~72小時才明顯可見。

(八) 過敏 / 過敏性反應：

上市後曾有發生與使用**acetaminophen**相關之過敏及過敏性反應的報告。臨床表徵包括臉、口及喉嚨腫脹、呼吸窘迫、蕁麻疹、皮疹、搔癢以及嘔吐。偶有發生危及生命並須緊急送醫治療之過敏性反應的案例。醫療人員應提醒病人，如果發生這些症狀，應立即停藥並就醫治療。曾對**acetaminophen**過敏的病人，亦應主動告知醫療人員，切勿使用含該成分之藥品。

(九) 嚴重皮膚反應：

使用**acetaminophen**的病人中，曾有少數發生嚴重且可能致命之皮膚反應的報告，如急性全身發疹性膿疱病(**Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP**)、史蒂文生氏-強生症候群(**Stevens-Johnson Syndrome, SJS**)和毒性表皮壞死溶解症(**Toxic Epidermal Necrolysis, TEN**)。病人應瞭解並被告知嚴重皮膚反應的症狀，以及出現皮疹或其他過敏症狀時，應停止使用本藥。

【孕婦、授乳婦之投與】

除非緊急或必要，否則本藥不宜供懷孕前期前三個月的孕婦使用。

授乳婦亦不宜使用。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】

一般而言，本藥的耐受性良好，偶有發生如，口乾、眩暈、衰弱及噁心現象。然而，這些副作用在降低劑量後即可消失。此外，如皮膚疹、白血球缺乏症或位態性低血壓等反應僅在高劑量投與後才會發生。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

6~1000錠鐵罐裝、塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號